

بررسی ارتباط بین برخی از شاخص‌های آنتروپومتریکی با توانایی‌های حرکتی پایه در دانش آموزان ۹ تا ۱۱ سال بیرون

سعید ایل بیگی^۱، محمدقاسم کاکی^۲، جواد فولادیان^۳، حسین فرزانه^۴

چکیده:

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین برخی از شاخص‌های آنتروپومتریک با توانایی‌های حرکتی پایه در دانش آموزان ۹ تا ۱۱ سال بیرون است. **روش تحقیق:** جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر غیر ورزشکار پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر بیرون از تعداد ۶۵۰ نفر بودند که از بین آنها، تعداد ۱۲۹ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوش ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. شاخص‌های آنتروپومتریک شامل: قد، وزن، زاویه Q، ارتفاع قد نشسته، طول اندام فوقانی، طول کف دست، پهنای شانه، طول ران، ارتفاع زانو، طول کف پا، پهنای شانه، پهنای جلو کف پا، و دور ران اندازه گیری شدند. برخی از قابلیت‌های جسمانی - حرکتی شامل پریدن، تعادل، انعطاف پذیری و چابکی با توجه به آزمون توانایی حرکتی پایه (BMAT) نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل دادها از روش همبستگی پیرسون در سطح $p \leq 0.05$ استفاده شد. **یافته‌ها:** بین توان انفجاری پاهای با دور بازو ($p=0.03$) و دور ران ($p=0.04$) رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد، ولی با سایر شاخص‌های آنتروپومتریک رابطه معنی داری به دست نیامد. بین میزان تعادل با ویژگی‌های پهنای پاشنه ($p=0.04$)، دور ساق پا ($p=0.04$)، و وزن بدن ($p=0.04$) رابطه معنی دار و مثبتی بدست آمد. بین چابکی با قد، وزن، ارتفاع زانو، طول ران، طول پا، و پهنای پاشنه نیز رابطه منفی معنی داری ($p < 0.05$) مشاهده گردید. **نتیجه گیری:** با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود در فرآیند استعدادیابی این عوامل مورد توجه قرار گیرند.

کلید واژه‌ها: شاخص‌های آنتروپومتریک، توانایی حرکتی پایه، ویژگی آمادگی جسمانی و حرکتی.

۱. نویسنده مسئول: استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرون، بیرون، ایران، آدرس: پردیس شوکت آباد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرون، بیرون، ایران؛ پست الکترونیکی: silbeigi@birjand.ac.ir

۲. کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرون، بیرون، ایران.

۳. استادیار گروه رشد و یادگیری حرکتی، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

۴. دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرون، بیرون، ایران.

راهایی برای رساندن ورزشکاران به بالاترین سطوح عملکرد ورزشی هستند. متخصصان و مربیان ورزش این مسئله را پذیرفته اند که عملکرد مطلوب به عوامل متعددی از جمله عوامل جسمانی، روان‌شناسی و مهارتی بستگی دارد (۳). خصوصیات آنتروپومتریک و وضعیت بدنی اگر چه ممکن است تنها بخشی از عوامل موثر در فعالیت‌های ورزشی باشد، اما برای مربیان مهم است تا این ویژگی‌ها را شناسایی کنند و قادر باشند ارزش آن را در ورزشکاران خود درک نمایند (۷). لذا هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین برخی از شاخص‌های آنتروپومتریک با توانایی‌های حرکتی پایه در دانش‌آموzan ۹ تا ۱۱ سال بیرون گردید. محقق با انجام این تحقیق در پی آن است که از بین شاخص‌های مورد ارزیابی، مهم ترین شاخص‌ها و ارزش‌های شاخص در زیر مقیاس‌های توانایی حرکتی پایه دانش‌آموzan را تعیین کند.

روش تحقیق

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموzan پسر غیر ورزشکار پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر بیرون گردید مشغول به تحصیل در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بودند که در محدوده سنی ۹ تا ۱۱ سال قرار داشتند. برای انتخاب نمونه‌ها روش نمونه برداری خوش‌های مورد استفاده قرار گرفت. شیوه عملیات برای انتخاب نمونه بدین صورت بود که به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان، ابتدا محدوده جغرافیایی شهر بیرون گردید. سپس به چهار بخش آموزشی تقسیم شد؛ به طوری که از بین مدارس پسرانه ابتدایی هر منطقه، یک دبستان به قید قرعه به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس با مراجعت به دبستان‌های منتخب و با همکاری و هماهنگی مسئولان مدرسه و معلم تربیت بدنی، انتخاب نمونه‌ها به صورت تصادفی خوش‌های انجام شد و جمعاً ۱۲۹ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

روش جمع آوری اطلاعات و نحوه اجرای تحقیق: پس از اخذ رضایت نامه کتبی از دانش‌آموzan و همچنین والدین، به منظور جمع آوری داده‌های تحقیق، از دو نوع اندازه‌گیری استفاده شد: الف: اندازه گیری شاخص‌های

مقدمه

از جمله مسائلی که در تربیت بدنی مطرح بوده و همواره ذهن انسان را به خود معطوف نموده است، چگونگی ساختمان بدن انسان و شکل ظاهری آن است و تحقیقات علمی فراوانی جهت شناخت آن وجود دارد. در سال های اخیر، تحقیقات زیادی بر روی رابطه اندازه‌ها و ابعاد بدن انسان با عملکرد حرکتی و موفقیت در رشته‌های مختلف ورزشی انجام شده است (۵، ۶، ۷)، در این راستا، سوالات زیادی در مورد رابطه بین این اندازه‌ها و عملکرد ورزشی، ذهن متخصصان را مشغول کرده است، از جمله این که آیا بازوی درازتر موجب توانایی بهتر انسان در گرفتن می‌شود؟ آیا کودکان قد بلندتر، بیشتر می‌پرند؟

نمی‌توان انکار نمود که طول بخش‌های بدن، رابطه متقابلی با مهارت‌های حرکتی در ورزش ندارد (۳). برای نمونه تحقیقات نشان می‌دهد که در اجرای برخی از مهارت‌های ورزشی، افراد بلند قد یا سنگین وزن، نسبت به افراد کوتاه و سبک، موفق تر هستند؛ در مقابل، در برخی موارد افراد کوتاه قد و سبک وزن نسبت به هم نوعان بلندتر یا سنگین وزن تر خود، موفق تر نشان داده اند (۷). از اطلاعات بدست آمده از این گونه تحقیقات، می‌توان برای مقایسه یک ورزشکار با سایر ورزشکاران استفاده نمود. برای مثال زنان ورزشکار دارای درصد چربی بیشتری نسبت به هم سن و سالان مرد می‌باشند (۸). علاوه بر این، در برخی از تحقیقات رابطه معنی داری بین کارآیی حرکتی و متغیرهای آنتروپومتریکی از قبیل دور مچ، و نسبت دور کمر به لگن بدست نیامده است، در حالی که رابطه معنی دار و مثبتی بین BMI و کارآیی حرکتی مشاهده شده است (۱۷). از طرف دیگر، برخی از محققان بیان کرده اند که چربی زیر پوستی نسبت به BMI و دور مچ، عامل مهم تری در پیش‌بینی آمادگی حرکتی و جسمانی به شمار می‌رود (۱۴). ورزشکارانی که در رشته‌های پر جنب جوش و استقامتی به فعالیت می‌پردازند و نیز آن‌هایی که باید وزن خود را جهت شرکت در مسابقات کنترل کنند، دارای درصد چربی کمتری نسبت به افراد غیر فعال هستند (۱۲). از سوی دیگر، مربیان ورزشی همواره به دنبال یافتن

اندازه گیری قد: آزمودنی با پای برنه پشت به نوار قدسنج که به دیوار چسبانیده شده بود طوری قرار گرفت که اولاً وزن بدنش به طور مساوی روی دو پا تقسیم شود، ثانیاً سر و تنہ و پاهای را در یک راستا قرار گیرد و پشت پاهای باسن و سرفرد دیوار را لمس کند. سپس با استفاده از خط کش که روی سر آزمودنی قرار داده شد و در حالت بازدم، قد فرد بر حسب سانتی متر اندازه گیری و ثبت گردید (۱۱).

اندازه گیری وزن: برای اندازه گیری وزن، آزمودنی با شورت ورزشی، روی ترازوی پوشکی طوری قرار گرفت تا وزن بدنش روی هر دو پا تقسیم شود. سپس وزن بدن فرد با دقت ۰/۱ کیلو گرم ثبت شد (۱۱).

اندازه گیری ارتفاع ساق پا: برای اندازه گیری ارتفاع ساق پا، آزمودنی به صورت ایستاده، در حالی که وزن بدن به طور مساوی بر روی دو پا تقسیم شود، با مداد مرکز استخوان کشک علامت گذاری شد و ارتفاع مرکز کشک تا زمین، به عنوان طول ساق پا ثبت گردید (۱۱).

اندازه گیری طول ران: برای اندازه گیری طول ران، نقطه ابتدایی، برجستگی بزرگ (تروکانتر بزرگ) استخوان ران؛ و نقطه انتهایی، وسط کوندیل خارجی ران می‌باشد، که با استفاده از متر نواری به طور دقیق اندازه گیری شد (۱۱).

اندازه گیری محیط ران: برای تعیین محیط ران از افراد خواسته شد تا پایی برتر خود را با اندکی فاصله، جلوتر قرار داده و بدین ترتیب بدون این که عضله فرد در حال انقباض و فعالیت باشد، با متر نواری محیط حجیم ترین بخش ران اندازه گیری شد (۱۱).

اندازه گیری پهنای پاشنه: فرد به صورت ایستاده قرار گرفت و در حالی که وزن به طور مساوی بر روی دو پا تقسیم شده بود، بوسیله کولیس، عرض استخوان پاشنه اندازه گیری شد (۱۱).

اندازه گیری پهنای جلوی کف پا: فرد به صورت ایستاده قرار گرفت و در حالی که وزن به طور مساوی بر روی دو پا تقسیم شده بود، فاصله سر

آنتروپومتریک (بدن سنجی)، بـ: اندازه گیری توانایی های حرکتی پایه.

نحوه اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک: اندازه گیری محیط بازو: برای اندازه گیری محیط بازو، آزمودنی در وضعیت ایستاده قرار گرفت و وزن بدنش را روی هر دو پا به طور مساوی تقسیم کرد. ابتدا زائده آرنجی و زائده منقاری توسط مداد بر روی پوست مشخص شد و سپس نقطه میانی بازو بر روی پوست علامت گذاری گردید و در حالی که عضلات ناحیه بازو بدون انقباض غیر عادی و کمی دورتر از تنہ قرار داشتند، با متر نواری دور بازو اندازه گیری و ثبت شد (۱۱).

اندازه گیری محیط ساعد: در حالی که آزمودنی دست خود را در کنار بدن به حالت آویزان و کمی دور از تنہ متمایل به جلو با وضعیت چرخش خارجی ساعد قرار می‌داد، با استفاده از متر نواری، محیط ضخیم ترین ناحیه ساعد بر حسب سانتی متر اندازه گیری و ثبت شد (۱۱).

اندازه گیری طول کف دست: آزمودنی در وضعیت ایستاده طوری قرار می‌گرفت، که وزن بدنش روی دو پا تقسیم شود. دست فرد به حالت طبیعی و بدون انقباض غیر عادی در کنار بدن آویزان ۹۰ می‌شد. ساعد به صورت افقی با تاکردن حدود ۹۰ درجه در ناحیه آرنج به سمت جلو آورده شد و کف دست صاف و کشیده رو به بالا قرار گرفت. در این حالت، فاصله بین نوک انگشت میانی با انتهای زائده نیزه ای استخوان زند زبرین، بر حسب سانتی متر محاسبه و ثبت شد (۱۱).

اندازه گیری طول دست: برای این منظور، هر آزمودنی در وضعیت ایستاده قرار می‌گرفت، دست در کنار بدن و به صورت دور از بدن (آبداکشن^۱) کمی از بدن فاصله داشت و انگشت میانی در حالت باز کردن (اکستنشن^۲) بود. سپس با مداد انتهای زائده آخرمی استخوان کتف بر روی پوست مشخص شد و فاصله بین زائده آخرمی تا نوک انگشت میانی، به عنوان طول دست اندازه گیری و ثبت شد (۱۱).

1. Abduction

2. Extension

توان عضلانی ران ها مورد استفاده قرار گرفت. در این روش، آزمودنی سه مرتبه مجاز بود آزمون پرسش طولی را انجام دهد. مسافت طولانی ترین پرش فرد در این سه مرتبه، با متر نواری اندازه گیری و به عنوان نمره آزمون ثبت شد (۲).

آزمون تعادل ایستا: برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون تعادل لک لک استفاده شد. در این آزمون، فرد دست ها را دو طرف بدن روی پهلوها قرار داده و پای دیگر را کمی به عقب انتقال داد. مدت زمانی را که فرد قادر به حفظ تعادل بود، به عنوان امتیاز تعادل وی ثبت شد (۲).

آزمون انعطاف پذیری عضلات کمر و پشت ران: برای ارزیابی انعطاف پذیری کمر و عضلات پشت ران، فرد با پاهای صاف روی زمین نشست. سپس با خم کردن (فلکشن) تنہ همراه با خم کردن ران و ستون مهره ها، دست ها را تا حد ممکن به جلو آورد، دورترین نقطه از صفحه مدرج روی تخته انعطاف پذیری به عنوان نمره آزمون ثبت شد (۲).

آزمون چاکی در دویدن: این آزمون برای ارزیابی توانایی سرعت حرکت و تغییر جهت بدن مورد استفاده قرار می گیرد. فرد به صورت زیگزاگ با حداکثر سرعت دور صندلی ها یا مخروط ها که با فاصله ۱/۵ متر در یک خط مستقیم قرار داشتند، در مدت زمان ۲۰ ثانیه دوید. نمره گذاری بر اساس تعداد مخروط هایی که فرد در طول ۲۰ ثانیه پشت سر می گذاشت، محاسبه شد (۲).

روش های آماری: در تحقیق حاضر علاوه بر آمار توصیفی، برای اطلاع از دارا بودن رابطه یا عدم رابطه بین شاخص های آنتروپومتریک و آزمون توانایی های حرکتی پایه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمام تجزیه و تحلیل های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۴ اجرا شدند و سطح معنی داری $p < 0.05$ در نظر گرفته شد.

نتایج: در جدول (۱)، اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای آنتروپومتریک مورد بررسی نشان داده شده است. نتایج تحقیق در مورد رابطه ویژگی های آنتروپومتریک

استخوان اول کف پا تا سر استخوان پنجم کف، به عنوان پهنانی جلوی کف پا ثبت شد (۱۱).

اندازه گیری طول کف پا: در حالت نشسته روی صندلی، فاصله پاشنه پا تا نوک بلند ترین انگشت پا به وسیله خط کش اندازه گیری شد (۱۱). **اندازه گیری ارتفاع قد نشسته:** در حالت نشسته روی صندلی، از سطح فوکانی سرتانشیمنگاه صندلی در حالی که بالاتنه و سررو گردن در یک راستا قرار داشتند، به عنوان طول قد نشسته در نظر گرفته شد (۱۱).

اندازه گیری پهنانی شانه: در حالت نشسته روی صندلی، فاصله بین دو زائده آخرمی با متر نواری اندازه گیری و به عنوان پهنانی شانه ثبت گردید (۱۱). **اندازه گیری محیط ساق پا:** دور ساق پا از قسمت میانی ساق، در سطح ناحیه حداکثر محیط عضلات ناحیه ساق اندازه گیری شد (۱۱).

اندازه گیری زاویه Q: برای اندازه گیری زاویه Q، مرکز کشک، برجستگی درشت نی و خار خاصره قدامی فوکانی، به طور دقیق لمس و با مداد علامت گذاری شد. مرکز گونیامتر روی مرکز کشک، بازوی بزرگ آن در جهت خار خاصره قدامی فوکانی، و بازوی کوچک آن روی برجستگی درشت نئی قرار داده شد، و بدین ترتیب زاویه ایجاد شده به عنوان زاویه Q، بر حسب درجه ثبت گردید (۲۰).

آزمون توانایی حرکتی پایه^۱ دانیل دی ارنهایم و ویلیامز ای سینکلر^۲ (BMAT): آزمون توانایی - حرکتی پایه (BMAT) ارنهایم و سینکلر (۱۹۷۴) برای ارزیابی توانایی های حرکتی پایه کودکان ۴-۱۲ ساله طراحی شده است. این آزمون شامل ۹ زیر مقیاس برای ارزیابی پاسخ های حرکتی در جهت کنترل عضلات ظریف و زمحت، تعادل پویا و ایستا، هماهنگی چشم و دست، و انعطاف پذیری در کودکان ۴-۱۲ ساله می باشد (۲۰). این آزمون در سال ۱۳۶۷ توسط گنجی هنجاریابی شده است (۶) و پایایی آزمون (به شیوه بازآزمایی) نیز برای کل آزمون با استفاده از نمونه گیری تصادفی، در حدود ۰/۸۹ به دست آمده است.

آزمون پریدن: این آزمون برای ارزیابی قدرت و

1. Basic Motor Ability Test

2. Daniel D. Arnheim and William A. Sinclair

جدول ۱. اطلاعات توصیفی متغیرهای آنتروپومتریک آزمودنی‌ها

متغیرها	تعداد	میانگین	انحراف استاندارد
قد (سانتیمتر)	۱۲۹	۱۴۰/۸۲	۷/۴۷
وزن (کیلوگرم)	۱۲۹	۳۵/۸۱	۸/۴۰
پهنای شانه (سانتیمتر)	۱۲۹	۳۲/۳۵	۲/۸۹
دور بازو (سانتیمتر)	۱۲۹	۲۰/۴۳	۲/۹۲
دور ساعد (سانتیمتر)	۱۲۹	۱۸/۳۴	۲/۴۹
طول ران (سانتیمتر)	۱۲۹	۴۵/۵۳	۳/۴۸
دور ران (سانتیمتر)	۱۲۹	۳۹/۳۴	۵/۵۹
دور ساق (سانتیمتر)	۱۲۹	۲۷/۷۶	۳/۶۰
ارتفاع زانو (سانتیمتر)	۱۲۹	۴۰/۶۵	۳/۵۴
طول پا (سانتیمتر)	۱۲۹	۲۱/۱۵	۱/۶۳
زاویه Q (درجه)	۱۲۹	۱۰/۵۲	۱/۳۴

($p=0.04$) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، در حالی که بین سایر شاخص‌ها رابطه معنی داری مشاهده نمی‌شود.

و آزمون‌های حرکتی در جداول ۲ تا ۵ آورده شده است. همان طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، بین آزمون پریدن با دور بازو ($p=0.03$) و دور ران

جدول ۲. ضریب همبستگی بین شاخص‌های آنتروپومتریک با آزمون پریدن

شاخص‌های آنتروپومتریک									
وزن	قد	دور	دور ساعد	دور بازو	دور	پهنای شانه	پهنای جلو پا	پهنای	پشنۀ
-۰/۱۳	-۰/۰۶	-۰/۱۱	-۰/۱۱	-۰/۰۲	-۰/۰۸	-۰/۰۱	-۰/۰۲	-۰/۰۴	-۰/۰۴
ضریب همبستگی									
شاخص‌های آنتروپومتریک									
ضاخته	ارتفاع زانو	طول پا	طول	دور	دور	پهنای شانه	پهنای جلو پا	پهنای	پشنۀ
-۰/۱۰	-۰/۰۵	-۰/۰۵	-۰/۰۳	-۰/۰۳	-۰/۰۳	-۰/۰۸	-۰/۰۱	-۰/۰۲	-۰/۰۲
ضریب همبستگی									

علامت (*) نشان‌دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p<0.05$ می‌باشد.

وزن بدن همبستگی معنی دار و مثبتی با میزان تعادل شرکت کنندگان دارند ($p=0.04$). علاوه بر این، همان طور که در جدول ۳ نشان داده شده است، دو ویژگی پهنهای پاشنه، دور ساق پا و همچنین

جدول ۳. ضریب همبستگی بین شاخص های آنتروپومتریک با آزمون تعادل

شاخص های آنتروپومتریک	وزن	قد	دور ساعد	دور بازو	زاویه Q	پهنهای شانه	پهنهای جلو پا	پهنهای پاشنه	ضریب همبستگی
ضریب همبستگی	-0.27(*)	-0.02	-0.00	-0.07	-0.12	-0/10	-0/07	-0/07	+0.28(*)
شاخص های آنتروپومتریک	-0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	طول اندام فوقانی
ضریب همبستگی	-0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	طول اندام فوکانی

علامت (*) نشان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p=0.05$ می باشد.

زانو ($p=0.04$) و طول اندام فوقانی ($p=0.03$) وجود دارد، در حالی که بین این شاخص و سایر ویژگی های آنتروپومتریک، رابطه معنی دار به دست نیامده است.

رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریک و انعطاف پذیری در جدول شماره ۴ آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود، رابطه مثبت و معنی دار بین آزمون انعطاف پذیری با طول کف دست ($p=0.04$)، ارتفاع

جدول ۴. ضریب همبستگی بین شاخص های آنتروپومتریک با انعطاف پذیری

شاخص های آنتروپومتریکی	وزن	قد	دور	دور	زاویه Q	پهنهای شانه	پهنهای جلو پا	پهنهای پاشنه	ضریب همبستگی
ضریب همبستگی	-0.09	-0.06	-0.09	-0.05	-0.03	-0/08	-0/01	-0/01	+0.11
شاخص های آنتروپومتریکی	-0.09	-0.06	-0.09	-0.05	-0.03	-0.08	-0.08	-0.08	طول اندام فوکانی
ضریب همبستگی	-0.26(*)	-0.14	-0.26(*)	-0.01	-0.09	-0/02	-0/01	-0/01	+0.29(*)

علامت (*) نشان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p=0.05$ می باشد.

رابطه بین شاخص های آنتروپومتریک با آزمون آزمون چابکی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

رابطه بین شاخص های آنتروپومتریک با آزمون چابکی (جدول ۵) نشان می دهد که فقط بین شاخص های قد ($p=0.03$)، وزن ($p=0.07$)، ارتفاع زانو

جدول ۵. ضریب همبستگی بین شاخص‌های آنتروپومتریک با آزمون چابکی

										شاخص‌های آنتروپومتریکی	
										ضریب همبستگی	
										شاخص‌های آنتروپومتریکی	
پاشنه	پهنانی جلو پا	پهنانی شانه	پهنانی Q	دور بازو	دور ساعده	دور قد	وزن	آنtronopometric	هmbstic	ضریب همبستگی	ضریب همبستگی
-+/-٠٦	+/-٠١	-+/-٢	-+/-١١	-+/-١٧	-+/-١٧	-+/-٢٦(*)	-+/-٣٠(**)	شان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.05$ می باشد.	شان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.05$ می باشد، علامت(**) نشان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.01$ می باشد.	شان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.05$ می باشد، علامت(*) نشان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.01$ می باشد.	شان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.05$ می باشد.
طول اندام فوقانی	قد نشسته	طول کف دست	دور ساق	طول ران	دور ران	طول پا	ارتفاع زانو	آنtronopometric	هmbstic	آنtronopometric	آنtronopometric
-+/-٠٥	+/-٠٢	-+/-٧	-+/-١٠	-+/-٢١(*)	-+/-١١	-+/-٢٧(*)	+/-٣٠(**)	شان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.05$ می باشد.	شان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.05$ می باشد.	شان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.05$ می باشد.	شان دهنده معنی دار بودن رابطه در سطح $p < 0.05$ می باشد.

بحث

علاوه بر این، بین آزمون تعادل با دو ویژگی پهنانی پاشنه، دور ساق پا، و وزن بدن شرکت کنندگان همبستگی معنی دار و مثبتی بدست آمد. باید در نظر داشت که هر چه وزن بیشتر باشد، پایداری که نوعی تعادل است، بیشتر می شود. همچنین داشتن سطح اتکای بیشتر و نزدیکی مرکز ثقل به زمین، از عوامل مهم در افزایش تعادل محسوب می شوند. از آن جا که افزایش پهنانی پاشنه با افزایش سطح اتکای فرد (۱)، و افزایش دور محیط ساق با افزایش حجم و جرم عضلانی اندام تحتانی همراه است؛ و چون انتقال مرکز ثقل به سمت جرم بیشتر است، کاهش ارتفاع مرکز ثقل و افزایش میزان تعادل و پایداری در فرد ایجاد خواهد شد (۱). در این ارتباط، کاستیک^۱ و همکاران (۲۰۰۹) نیز نشان داده اند که کاهش ارتفاع مرکز ثقل به سمت اندام تحتانی، در نتیجه افزایش برخی از پارامترها از قبیل افزایش وزن اندام تحتانی مثل ساق و مج می تواند باعث افزایش هماهنگی و تعادل بیشتر در حین مهارت هایی شود که نیاز به پایداری و کنترل بیشتری دارند (۱۲).

همچنین، رابطه بین ویژگی های آنtronopometric با انعطاف پذیری نشان از ارتباط انعطاف پذیری بیشتر با داشتن طول دست بزرگتر و همچنین ارتفاع زانوی

با توجه به اطلاعات جدول (۲)، بین شاخص های دور بازو و دور ران همبستگی مثبتی با پریدن وجود دارد، یعنی هرچه محیط دور بازو و دور ران افراد بیشتر باشد، فرد در آزمون پریدن امتیاز بالاتری را به دست خواهد آورد. در این راستا، توسط هافمن^۲ و همکاران (۱۹۷۷) بین شاخص قد و پرش جفتی طول همبستگی مثبت برابر $r = 0.39$ بدست آورده اند (۱۰). علاوه بر این، نقیبی (۱۹۸۵) در تحقیقی که رابطه اندازه های آنtronopometric اندام تحتانی با عملکرد حرکتی را بررسی کرده است، بین اندازه طول اندام تحتانی، فاصله دو تاج خاصره، و عرض زانو با پرش جفت رابطه مثبت و معنی داری بدست آورده است (۱۵). البته در برخی موارد نیز عدم رابطه شاخص های آنtronopometric با پرش طول بدست آمده است، از جمله فلیش من^۳ (۱۹۶۴) در تحقیق خود بین پرش طول جفتی با ارتفاع قد و وزن رابطه معنی داری بدست نیاورده است که احتمالاً به دلیل تفاوت در نوع آزمونی های تحقیق می باشد (۴). در مجموع، به نظر می رسد که داشتن دور بازو و ران بیشتر نشان از داشتن حجم عضلانی بیشتر است، و افرادی که از حجم عضلانی بالاتری برخوردار باشند، معمولاً در قابلیت های انفجاری و قدرتی، از قبیل پرش جفت

1. Hoffman

2. Fleishman

3. Kostic

چابکی رابطه منفی و معنی داری مشاهده کرده است (۹). از عوامل دخیل در این زمینه می‌توان به این نکته اشاره نمود که چابکی معیاری از عکس العمل و سرعت بالا می‌باشد؛ در تحقیقات انجام شده نیز برداشت وزن سبک، ارتفاع قد مناسب، و هماهنگی بین ساختارهای دست و پا؛ برای بهبود چابکی تأکید شده است (۶، ۷).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش در مورد رابطه عوامل آنتروپومتریکی با برخی از توانایی‌های حرکتی می‌توان نتیجه گرفت که لزوم توجه به عوامل آنتروپومتریکی مهم و تاثیرگذار در ارتباط با هر قابلیت و مهارت ورزشی، می‌تواند نقش قابل توجهی هم در شناسایی استعدادها و هم در موفقیت در رشته‌های ورزشی داشته باشد. نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می‌کند که برای موفقیت در ورزش‌هایی که نیاز به توان انفجاری بالا دارند، حجم عضلات اندام‌هایی مثل بازو و ران، و برای فعالیت‌هایی که نیاز به تعادل بالا دارند، افزایش پهنهای پا و افزایش وزن اندام تحتانی، و در نهایت کاهش ارتفاع اندام‌ها به ویژه طول دست و پا؛ می‌تواند در موفقیت فعالیت‌های نیازمند چابکی بالا، موثر باشد.

تقدیر و تشکر

نویسنده‌گان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به دلیل همکاری در اجرای این تحقیق ابزار می‌دارند.

بالاتر دارد. محققان بر این باورند که تفاوت میان اندازه‌های دست و پا، نتایج بهتری در آزمون خمش به جلو را موجب می‌شود و به این ترتیب، افرادی که پای بلند و دست کوتاه دارند؛ امتیاز کمتری نسبت به افرادی که پای کوتاه و دست بلند دارند، به دست می‌آورند (۱۸). این یافته‌ها با نتایج پژوهش حاضر همسو می‌باشد. فلیش من (۱۹۸۲) رابطه معنی داری بین قد و وزن بدن با آزمون انعطاف پذیری خمش به جلو بدست نیاورده است که با نتایج این تحقیق حاضر همخوانی دارد (۴). سلیمی (۱۹۸۷) نیز در تحقیق خود بین متغیرهای وزن، قد، طول پاها، طول بالاتنه و طول یک دست، با آزمون انعطاف پذیری رابطه معنی داری مشاهده نکرده است (۱۶)؛ و ملاحظه می‌گردد که بجز شاخص طول دست، سایر نتایج بدست آمده با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. همچنین محققین نشان داده اند که آزمون انعطاف پذیری خمش به جلو تا حدودی تحت تاثیر انعطاف پذیری عضله همسترینگ قرار می‌گیرد، و از آن جایی که این محققین نشان داده اند که نتایج آزمون خمش به جلو با انعطاف پذیری عضله‌های همسترینگ رابطه مثبت و معنی داری (به ترتیب در مردان =۰/۴۰، و زنان =۰/۶۶) دارد؛ به نظر می‌رسد بکارگیری شیوه‌ای دقیق و معتبر برای ارزیابی انعطاف پذیری عضلات همسترینگ بسیار مهم است (۲۱، ۲۲). به عبارت دیگر، ارزیابی میزان انعطاف این گروه از عضلات هم به عنوان یکی از عوامل مهم خمش به جلو، باید همواره مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این‌ها، نتایج پژوهش حاضر در مورد رابطه بین شاخص‌های آنتروپومتریکی با آزمون چابکی نشان داد که بین قد، وزن، طول ران، ارتفاع زانو و طول پا؛ با آزمون چابکی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. نتایج این تحقیق با تحقیق فلیش من (۱۹۸۲) همخوانی دارد (۴)، وی نیز بین قد، وزن و آرمون چابکی رابطه منفی و معنی داری گزارش کرده است. حمیدی (۱۹۷۴) نیز بر خلاف قد، بین وزن بدن و

منابع

1. Anthony, B., 2010. *Sports biomechanics: The basics: optimizing human performance*. Translated by: Ilbeigi, S., Nasirzadeh, A., Mohebi, B. and Arghavani, H., 1st Edition, Sport sciences research center Publication. pp. 96-106. [Persian]
2. Arnhem, D. S., 1992. *Exercise therapy*, Translate by: Hamid Alizadeh, 1st Edetion, Madreseh publication, Tehran. [Persian]
3. Ataei, A., 1980. Statistical correlation between height, body weight, age and physical fitness for boys, middle school 6th district of Tehran, M.Sc. Thesis in Physical Education, Islamic Azad University, Tehran Branch. [Persian]
4. Fleishman, E.A., 1982. Systems for describing human tasks. *American Psychologist*. vol. 37. No. 7, pp. 821-824.
5. Frasat, D., 1975. *Sports Psychology*, Translate by: Alijani E., Nourbakhsh M., Samt Publication, pp.35-31 . [Persian]
6. Ganji, A., 1985. Normalization of scale standardization Arnham, M.Sc. Thesis in Physical Education, Tehran University, Faculty of Education and Psychology. [Persian]
7. Ghamari. M., 1996. Comparison of lumbar lordosis, thoracic and scapular position in between Wrestler Athletes. M.Sc. Thesis in Physical Education, Tehran University, Faculty of Physical Education. [Persian]
8. Gutin, E., Barbeau, P., Owens, S., Lemmon, C. et al. (2002). Effects of exercise intensity on cardiovascular fitness, total body composition, and visceral adiposity of obese adolescents *The American Journal of Clinical Nutrition*, vol. 75. No. 5, pp. 818-826.
9. Hamidi, j., 1974. The relationship between body composition, anthropometrical parameters, and Vo2max with AAHPERD test, M.Sc. Thesis in Physical Education, Tehran University, Faculty of Physical Education [Persian].
10. Hoffman, S.J., 1977. *Competency based training in skill analysis: Designing assessment systems*. In R.E. Stadulis (Ed.), *Research and practice in physical education*. pp. 3-12. Champaign, L: Human Kinetics.
11. Isak, 2001. *International standards for anthropometric assessment*, Published by the: International Society for the Advancement of Kinanthropometry, School of Physical Education, Exercise and Sport Studies, University of South Australia.
12. Kostic, R., Duraskovic, R., Pantelic, S., Zivkovic, D., et al., 2009. The relationship between anthropometric characteristic and coordination skills. *Journal of Physical Education and Sport*, vol. 7. No. 1, pp. 101 – 112.
13. Lum Eunice K. Y., 2008. Relationships between motor skill performance and measures anthropometric of body segments in the kindergarten children, M.Sc. Thesis in Physical Education and recreational management, Hong Kong, Baptist University.
14. Milanese M., Bortolami O., Bertucco M., Verlato G., et al., 2010. Anthropometry and motor fitness in children aged 6-12 years. *Journal of Human Sport & Exercise*, vol. 4. No. 2, pp. 265-279.
15. Naghibi, N., 1985. The relationship between anthropometrical measures of lower extremity with running and jumping skills in 11 years old students, M.Sc. Thesis in Physical Education, Faculty of Physical Education, University of Tehran. [Persian]
16. Salimi, F., 1987. The Comparison of anthropometrical parameters and general physical fitness in handball players. M.Sc. Thesis in Physical Education, Faculty of Physical Education, University of Tehran [Persian].
17. Sheikh M., Vesalinaseh M. Nasiri E., 2012. Relationship between Motor Proficiency and Anthropometric Measure in Six to Twelve Years-Old Children. *Journal of Annals of Biological Research*, vol. 3 (7), pp. 3765-3770.
18. Singer, R.N., 1972. *Coaching, athletics, and psychology*. New York: McGraw-Hill Pub. pp.125-156.
19. Slaughter M.H., Lohman T. G., Misner J.E., 1997. Relationship of somatotype and body composition to physical performance in 7 to 12 year old boys. *Research Quarterly*, vol. 48. No. 1, pp. 159-168.
20. Stini. W., 1989. *Perspective in Kinanthropometry*, Human kinetic Pub., pp. 5-23.
21. Timoty. G, Lohman, Alex. F., Roche, Reynaldo, M., 1998. *Anthropometric standardization reference manual*, Human Kinetics Pub. pp. 20-24.
22. Toriola A.L., Adeniran S.A., Ogunremi P.T., 1987. Body composition and anthropometric characteristics of elite male basketball and volleyball players, *Journal Sports Medicine and Physical Fitness*, vol. 27. No. 2, pp.235-239.

Abstract

The relationship between some of anthropometric variables and basic motor abilities in primary school boys aged 9 -11 years of Birjand

Saeed Ilbeigi¹, Mohamad Ghasem Kaki², Javad Fooladian³, Hosssein Farzaneh⁴

Aim and Background: The purpose of this study was to investigate the relationship between some of anthropometric variables and basic motor abilities in primary school boys aged 9 -11 years of Birjand. **Materials and Methods:** The population was 650 boys' students in fourth and fifth grade in birjand city, those 129 students (9-11 years old) randomly were selected as sample group. Anthropometric measurements such as: height, weight, sitting height, shoulder width, knee height, Q angle, hand length, thigh length, foot length, heel width, the width of the front foot, thigh circumference, arms circumference, legs circumference , arms circumference were measured. Moreover, the basic motor abilities tests, including balance test, jumping test, agility test and flexibility was done. The statistical analysis was done, using the Pearson correlation coefficients between anthropometric indices and basic motor skills. **Results:** The results showed significant relationship between jumping and thigh and shank girths ($p \leq 0.05$). Moreover, the same results were found between balance test and shank girth, weight and heel width. The results also indicated the significant negative correlation between agility and height, weight, knee height, thigh height, and foot height. **Conclusion:** Generally the results suggested that the some parameters can be considered as important factor for talent selection between children and adolescent.

Keywords: Anthropometric parameters, Basic motor abilities, Physical & motor fitness characteristics.

Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport, vol. 2, no. 3, Spring & Summer, 2014

Received: Nov 19, 2013

Accepted: Feb 17, 2014

1. Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran, Address: Shokat Abad, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran; Email: Silbeigi@birjand.ac.ir
2. MSc of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
3. Assistant Professor, Department of Motor Behavior, University of Imam Reza, Mashhad, Iran
4. MSc Student of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran